Solenanthus lanatus Alph. DC. (Anchusa lanata L.). — Lieux herbeux aux bords des chemins.
Rochelia stellulata Rchb. — Bords des champs; rare.
Borrago officinalis L. — Ibid.
— longifolia Poir. — Fossés herbeux frais.

(*La fin à la prochaine séance.*)

M. Cosson donne lecture de l'extrait suivant d'une lettre qu'il a reçue de M. Alph. De Candolle :

NOTE SUR LE *QUERCUS CASTANEÆFOLIA* D'ALGÉRIE,
par **M. Alph. DE CANDOLLE.**

(Genève, janvier 1866.)

Un Chêne d'Algérie, rapporté autrefois par MM. J. Gay et Cosson au *Q. castaneæfolia* C.-A. Mey., du Caucase, avait été reconnu ensuite par le si regrettable M. J. Gay être le *Q. Pseudosuber* Santi; j'avais confirmé cette dernière opinion en me fondant sur des échantillons authentiques de Toscane. J'ignorais alors que M. Cosson avait constaté que les deux espèces existent en Algérie. Ayant reçu récemment de meilleurs échantillons de la province de Constantine, district de Philippeville, je puis distinguer nettement les deux arbres, même sans avoir des fruits mûrs. Le *Q. castaneæfolia* présente des feuilles plus allongées, dont les nervures sont toujours plus nombreuses que dans le *Q. Pseudosuber*. Il n'a pas de liége, du moins en quantité visible pour un observateur non-botaniste, tandis que le *Q. Pseudosuber* a véritablement du liége, bien qu'en quantité non comparable, il est vrai, à celle du *Q. Suber* et insuffisante pour le rendre utile au point de vue économique. Les échantillons déterminés par M. Cosson sous le nom de *Q. castaneæfolia*, dans l'exsiccata édité par M. Kralik (*Plantæ algerienses selectæ*), appartiennent bien à cette espèce, et j'ai eu tort d'exclure dans le *Prodromus* tous les échantillons d'Algérie du *Q. castaneæfolia*. Les personnes qui se servent du *Prodromus* feront bien de modifier dans ce sens les articles des deux espèces, t. XVI, sect. post., pp. 43 et 49.

M. Cosson dit qu'il est heureux de voir confirmer par le savant monographe des Cupulifères la détermination du Chêne publié par M. Kralik dans ses *Plantæ algerienses selectæ*.

Il ajoute que le *Q. castaneæfolia* observé par ses compagnons de voyage et par lui, en 1861, sur plusieurs montagnes de la Kabylie orientale (Djebel-Gouffi, massif montagneux des Beni-Foughal, Taourirt-el-Ghil, etc.), est surtout très-abondant aux Djebel Tababor et Babor. Cet arbre forme l'essence

principale des belles forêts de ces deux massifs montagneux ; il y est associé au *Q. Mirbeckii*, au *Cedrus Libani* var. *atlantica* et à l'*Abies* (*Picea*) *Pinsapo* var. *baborensis* (*Abies* [*Picea*] *baborensis* Coss. mss. olim). — M. Cosson croit en outre devoir faire remarquer que les forêts des Babors offrent une espèce nouvelle d'*Epimedium* (*E. Perralderianum*) très voisine de l'*E. pinnatum* propre aux régions caucasiennes.

SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1866.

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE JAUBERT.

M. Roze, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 26 janvier, dont la rédaction est adoptée.

Par suite des présentations faites dans la dernière séance, M. le Président proclame l'admission de :

MM. Jozon (Eugène-Charles), pharmacien, rue Saint-Jean, 38, à Laon (Aisne), présenté par MM. Thibesard et de Schœnefeld ;

Chapelle, docteur en médecine, médecin de l'hôpital d'Angoulême (Charente), présenté par MM. Chatin et Lasègue.

M. le Président annonce en outre trois nouvelles présentations.

Lecture est donnée de lettres de MM. Cabasse, Eichler et Chabert, qui remercient la Société de les avoir admis au nombre de ses membres.

M. le Président annonce à la Société la perte bien regrettable qu'elle vient de faire dans la personne de M. le pasteur Magnan, décédé à Montauban le 1er février.

Dons faits à la Société :

1° Par M. Ad. Chatin :

Le Cresson.

2° Par M. L. Netto :

Apontamentos sobre a collecçâo das plantas economicas da Brasil.

3° De la part de M. Émile Boudier :

Des Champignons,